

BUSTER

Conține: Bacillus thuringiensis 1.5×10^8 ufc/ml, ulei vegetal 2% (glycerol-material inert)

Îngrășământ

Formulare: concentrat solubil

Fraze de pericol

Nu se aplică

Fraze de precauție

P501 - Eliminați conținutul /recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor.

e L

Lot. nr: vezi sus

Data fabricației: vezi sus

Termen de valabilitate: 24 de luni

Depozitare: Se va depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Temperatura de depozitare $5^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$

Atenție: Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării.

Autorizație RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT Nr.

Producător: Norofert SA

Strada LT. AV. Șerban Petrescu, Nr. 20, Sector 1,

București, România

Telefon: 0766 080 767

În atenția dumneavoastră: Agitați energic recipientul pentru 15-20 secunde pentru o bună omogenizare. Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

BUSTER

Mod de acțiune:

Efect benefic al *B. thuringiensis* ca biofertilizant și promotor de creștere a plantelor. Promovează creșterea, toleranța la stresul provocat de secetă și crește absorbția și utilizarea nutrienților. Poate duce la creșterea înălțimii tulpinii, a lungimii rădăcinii, a greutateii fructului și a greutateii totale uscate la plante. Plantele cresc absorbția de nutrienți în medii secetoase și sporesc aportul de macro și micronutrienți. și ajută plantele să supraviețuiască stresurilor de mediu, cum ar fi metalele grele. Ajuns în sol are capacitatea de a transforma P insolubil în formă solubilă.

Mod de folosire:

Cultura	Doza
Floarea-soarelui	1 l/ha
Grâu de toamnă	1 l/ha
Rapiță de toamnă	1 l/ha
Porumb	1 l/ha
Soia	1 l/ha

Momentul aplicării:

Poate fi aplicat pe toată durata perioadei de vegetație, în mai multe aplicări la un interval de 14-21 zile.

Pregătirea soluției:

Se umple rezervorul mașinii de tratat până la jumătate, se adaugă cantitatea adecvată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Se va agita bine soluția de stropit în timpul umplerii și aplicării. Se va folosi apă curată din surse cunoscute.

Tehnica de aplicare:

Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în câmp a produselor, utilizate în mod obișnuit la culturile sus menționate. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit. Se recomandă utilizarea volumului de soluție de 200-400 l/ha, astfel încât să existe o bună penetrare și acoperire a culturii. Soluția se va aplica imediat după amestecare.

Recomandări de aplicare:

Nu se va păstra soluția pregătită peste noapte. Se va evita aplicarea în mijlocul zilei când sunt temperaturi ce depășesc 25°C. Dacă survine o ploaie în scurt timp după aplicare va fi necesar a se repeta tratamentul. Nu se aplică atunci când viteza vântului favorizează deriva dincolo de zona destinată tratamentului.

Compatibilitate: se va evita amestecul cu alte produse pentru a preveni inactivarea microorganismelor.

Timp de pauză: 0 zile

Curățarea echipamentului: Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune înainte și după aplicare, și în mod particular dacă a fost folosit înainte de Buster un produs care ar putea aduce pagube culturii.